

h+s h+s h+s h+s h+s h+s

MYOCURATTIN®-FCM-Granulat

gebrauchsfertiger Getreide-Frisch-Köder
mit anlockender Zerealien-Komposition

- extrem hohe Annahmattraktivität
- schnelle und sichere Tilgung

BIOZID-Zulassungs-Nr.:

DE-00000967-14

AT-0001333-0000

Anerkennung § 18 IfSG

(B-0151-00-00/01)

Gebrauchsanleitung und Vorsichtsmaßnahmen:

Die ausgebrachte Ködermenge laufend kontrollieren und so lange nachlegen, bis keine Annahme mehr erfolgt (siehe Packungsbeilage/Merkblatt). Nach Möglichkeit Warnzettel kleben! Nach Abschluss der Bekämpfung nicht angenommene Köder einsammeln und entsorgen. Während der Anwendung des Produktes regelmäßig nach toten Nagern suchen und diese entsprechend den lokalen Anforderungen entsorgen, um Sekundärvergiftungen vorzubeugen. Unzugänglich für Kinder, Vögel, Nutztiere und andere Nicht-Zieltiere platzieren. In und um Gebäude deutlich gekennzeichnete Köderdepots nutzen (nur in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind, verdeckte Auslegung ohne Depot möglich). Beutel gegen Verschleppen sichern. Köder so anbringen, dass sie nicht mit Wasser (z. B. an Wasserleitsystemen, Gewässern) in Kontakt kommen, überschwemmt oder weggespült werden. **Vorsicht!** Nur zur Schädlingsbekämpfung nach Gebrauchsanleitung! Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Achtung, Rodentizid. Verschlucken kann zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln sowie Küchengerätschaft und Zubereitungsflächen fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken, rauchen. Bei der Anwendung des Produktes sowie bei möglicher Entsorgung von Kadavern Chemikalienschutzhandschuhe (EN 374, Kat III) aus Nitril (0,12 mm), z. B. Touch N Tuff (Ansell) tragen. Kühl und trocken lagern! Mittel nicht in Gewässer und die Umwelt gelangen lassen. Gefährlich für Wildtiere. Produkt nicht zur Pulsbeköderung verwenden. Bei Unwirksamkeit des Produktes ist die Zulassungsinhaberin zu informieren.

Erste Hilfe: Nach Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen. Nach Verschlucken Arzt aufsuchen und Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Prothrombinzeit (Quick-Wert bzw. INR) bestimmen. Ggf. später wiederholen. Difenacoum kann verzögerte Wirkung haben! Antidot: Vitamin K₁ (Phytomenadion).

Entsorgung: Siehe Packungsbeilage/Merkblatt.

Wirkstoff: Difenacoum 0,05 g/kg [Antidot: Vitamin K₁ (Phytomenadion)]

Enthält Farb- und Bitterstoff gegen versehentliche Aufnahme.

zur Bekämpfung hygieschädlicher Wanderatten, Hausratten und Hausmäuse

z. B. Gesundheits- und Hygienebereich, Lebensmittel- und Futtermittelproduktion, Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie, Kommunalbereiche (Parks, öffentliches Grün, Kanalisation, Klärwerke, Entsorgungsbereiche, etc.), landwirtschaftliche Bereiche (z. B. Tierhaltung), Material- und Bautenschutz etc.

MYOCURATTIN®-FCM-Granulat an den bevorzugten Befallsstellen, direkt an den Laufwegen und in der Nähe der Nistplätze und Verstecke witterungsgeschützt auslegen. Köderstellen laufend kontrollieren und bei Bedarf nachlegen. Den Köder mittels Dosierhilfe anwenden. **Bei behördlich angeordneten Entwesungsmaßnahmen Packungsbeilage beachten.**

Wirkungsweise: Blutgerinnungshemmer der zweiten Generation, welcher Ratten in der Regel schon nach einmaliger Köderaufnahme innerhalb weniger Tage abtötet. Eine wiederholte Aufnahme potenziert jedoch die Wirkung. Der Tod der Nager tritt wirkungsverzögert erst einige Tage nach Köderaufnahme ein, dadurch speziell bei Ratten keine Warnung der Artgenossen, keine Köderscheu.

Anwendungsbereiche:

Wanderratte: in und um Gebäude^{1,2,3}, offenes Gelände, Mülldeponien, Kanalisation^{1,2}

Hausratte: in und um Gebäude^{1,2,3}, offenes Gelände, Mülldeponien^{1,2}

Hausmaus: in und um Gebäude^{1,2,3}

(¹geschulte berufsmäßige Verwender in DE, ²konzessionierte Schädlingsbekämpfer in AT, ³berufsmäßiger Anwender in AT)

Aufwandmengen:

Rattenbekämpfung:

Je nach Stärke des Befalls 200 g pro Köderstelle auslegen. Bei starken Populationen Köderstellennetz nach Bedarf verdichten. An feuchten Befallsstellen (z. B. Kanalisation) den wasserdichten Portionsbeutel verwenden. möglichst viele Einzelportionen anbieten, maximal 50 g pro Köderstelle.

Mäusebekämpfung:

MYOCURATTIN®-FCM-Granulat sicher verwenden. Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen sowie alle Informationen, die während des Kaufs übermittelt werden, lesen und befolgen. Bei der Verwendung dieses Rodentizids sind die dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Nur für die berufsmäßige Verwendung.

Zulassungsinhaber: HENTSCHKE & SAWATZKI KG

Leinestr. 17, 24539 Neumünster

1./06/21/Be



hentschke + sawatzki
CHEMISCHE FABRIK GMBH
24539 Neumünster · Leinestraße 17
Telefon +49 4321 98 72-0
www.hentschke-sawatzki.de



021202000



021202500

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.